

## RINCON 25 SG

### PROFIL PŘÍPRAVKU DLE ETIKETY

#### ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Kukuřice	pýr plazivý, ježatka kuří noha, plevel dvouděložné jednoleté	60 g/ha	AT	1) od: 10 BBCH do: 17 BBCH	+ smáčedlo Adjuvinn 0,05 %
Brambor	pýr plazivý, ježatka kuří noha, plevel dvouděložné jednoleté	60 g/ha	AT	1) do: 29 BBCH	+ smáčedlo Adjuvinn 0,05 %

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Kukuřice, brambor*	200–300 l vody/ha	postřik	max. 1 x	

\*) Při sólo aplikacích je vždy nutno přidat smáčedlo Adjuvinn 0,05 % (50 ml/100 l vody)


### HERBICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti plevelům



### FUNGICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti houbovým chorobám



### INSEKTICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti škůdcům



✉ [info\\_cz@innvigo.com](mailto:info_cz@innvigo.com)

🌐 [www.innvigo.com](http://www.innvigo.com)

☎ +420 226 205 420

🏢 INNVIGO Agrar CZ s.r.o. | Thámová 137/16 | 186 00 Praha 8

**innvigo**  
Better chemistry

**RINCON 25 SG**  
Důvěrný ochránce VAŠICH polí

✓ POROST KUKUŘICE A BRAMBOR BEZ POŠKOZENÍ

✓ NEKOMPROMISNÍ OCHRANA PROTI PLEVELŮM

[www.innvigo.com](http://www.innvigo.com)

# RINCON 25 SG

DŮVĚRNÝ OCHRÁNCE VAŠICH POLÍ

## PRAXÍ OVĚŘENÁ ÚČINNÁ LÁTKA

Rincon 25 SG obsahuje dokonale známou, osvědčenou a efektivní účinnou látku rimsulfuron ve formě SG zajišťující ještě rychlejší šíření účinné látky uvnitř plevelů – brzdí jejich vývoj již za hodinu od aplikace.

Rincon 25 SG je ideální pro aplikace na list při ochraně kukuřice a bramboru ihned po jejich vyklíčení.

## ŠIROKÉ SPEKTRUM HUBENÝCH PLEVELŮ

Díky širokému spektru účinku se Rincon 25 SG stává nezbytný při ochraně proti plevelům v kukuřici a bramboru. Seznam hubitelných plevelů zahrnuje ty nejvýznamnější jak ze skupiny jednoděložných, tak dvouděložných.

### DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE CITLIVÉ NA RIMSULFURON

tetlucha kozí pysk	hluchavka nachová	svízel přítula	laskavce
kakost	hluchavka objímavá	rmen rolní	šťovíky
zemědým lékařský	mák vlčí	heřmánek pravý	kokoška pastuší tobolka
hořčice polní	heřmánek nevonný	ředkev ohnice	penízek rolní
ptačinec prostřední	pcháč rolní	výdrol řepky	pryšec kolovratec

### JEDNODĚLOŽNÉ PLEVELE CITLIVÉ NA RIMSULFURON JSOU MIMO JINÉ

ježatka kuří noha	oves hluchý	pýr plazivý	psárka polní
chundelka metlice	béry		

## OBLÍBENÁ ÚČINNÁ LÁTKA SE SPOLEHLIVÝM ÚČINKEM

Po léta neslábnoucí oblíbenost rimsulfuronu je potvrzením jeho spolehlivého účinku. Nejlepších efektů po aplikaci herbicidu Rincon 25 SG dosáhnete, budete-li jej aplikovat na plevely v jejich nejcitlivějších vývojových fázích, tj. do 2–4 listů.

Rincon 25 SG, to je také vysoká flexibilita pro provedení postřiku: od 1.–7. listu kukuřice, u bramboru pak od vyklíčení do počátku fáze prodlužovacího růstu. Takové možnosti aplikace zajišťují bezpečnost a vysoký stupeň ochrany kukuřice a bramboru.

## VYSOKÁ EFEKTIVITA ZA PŘÍZNVOU CENU


Rincon 25 SG se vyznačuje příznivou cenou, která umožňuje sestavovat efektivní tank mix směsi přizpůsobené polním podmínkám. **Herbicide Rincon 25 SG v technologii hubení plevelů, to je racionální investice, která se vyplatí a mnohonásobně vrátí.**

## DOPORUČENÍ K APLIKACI HERBICIDU RINCON 25 SG

Rincon 25 SG můžete aplikovat v mnoha kombinacích s různými přípravky. Je nutno vždy přidat smáčedlo Adjuvinn.

## KUKUŘICE

Příklady herbicidního ošetření v kukuřici.



## BRAMBORY

Příklady a doporučení sekvenční aplikace herbicidů při ochraně brambor.



**První ošetření** – před samotným vyklíčením brambor na klíčící plevely nebo po vyklíčení do 10 cm výšky brambor na mladé klíčící plevely

**Druhé** – na malé plevely, 2 - 4 listy u dvouděložných a 1 - 3 listy u jednoděložných

\* metribuzin u citlivých odrůd je možné aplikovat pouze a výhradně před vyklíčením

\*\* linuron je možné aplikovat pouze před vyklíčením bramboru

## PROČ STOJÍ ZA TO VYBRAT RINCON PRO HERBICIDNÍ OCHRANU BRAMBOR?

- » Rincon nemá žádná omezení pro pěstování následných plodin po sklizni bramboru.
- » U přípravku Rincon nedochází k druhové citlivosti
- » Rincon je možné aplikovat v každé vývojové fázi brambor včetně těch, které jsou určeny k rychlému prodeji, bez obav z překročení povolené úrovně reziduí účinné látky.

Tato flexibilita doby aplikace umožňuje přizpůsobit čas ošetření na období, ve kterém se objeví některé teplomilné plevely, zejména v letech s chladným jarem. Mezi tyto obtížné plevely patří např. pcháč rolní či prosovité trávy.

### Upozornění:

Při přípravě a následné aplikaci tank mix směsí s jinými přípravky se řiďte platnou etiketou. Směs je vhodná před ošetřením vždy vyzkoušet. Při používání přípravků na ochranu rostlin zachovejte bezpečnost. Před každým použitím si přečtěte informace na etiketě a informace o přípravku. Věnujte pozornost větám označujícím specifickou rizikovost a zajistěte bezpečnostní opatření uvedená na etiketě.