

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtete příložený návod k použití

Apis 200 SE

Apis 200 SE je systémově působící insekticid ve formě suspo emulze určený k ochraně před živočišnými škůdci řepky olejky ozimé, bramboru, pšenice ozimé a pro menšinová použití.

Profesionální uživatel

NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ LÁTKY:

acetamiprid 200 g/l (20 % v/v)

NÁZEV NEBEZPEČNÉ LÁTKY:

Acetamiprid, benzisothiazolin-3-on, ethoxylované alkoholy

Označení přípravku:



Varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody při aplikaci do řepky olejky ozimé a pšenice ozimé.

INNVIGO Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 178,

02-486 Varšava

POLAND

Držitel rozhodnutí o povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo konečné označení přípravku na trhu:

INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Varšava, POLSKO
tel.: +48 22 468 26 70
e-mail: biuro@innvigo.com; RD@chemirol.com.pl

Právní zástupce v ČR:

INNIGO Agrar CZ s.r.o.
Thámová 137/16
186 00 Praha 8
Tel.: +420 226 205 420

Evidenční číslo přípravku: 5385-0

Číslo šarže:

Datum výroby formulace:

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +0 °C až + 30 °C

MNOŽSTVÍ PŘÍPRAVKU V OBALU:

HDPE/PA (COEX) láhev s přípravkem v množství 100 ml; 250 ml; 500 ml a 1 l;
HDPE/PA (COEX) kanystř s přípravkem v množství 5 l a 10 l.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ:

Insekticid působící systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců.

NÁVOD K POUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka ozimá	blýskáček řepkový	0,12-0,25 l/ha	39	1) od: 55 BBCH, do: 66 BBCH	
řepka olejka ozimá	krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová	0,12-0,25 l/ha	39	1) od: 64 BBCH, do: 69 BBCH	
řepka olejka ozimá	krytonosec čtyřzubý	0,25-0,3 l/ha	39	1) od: 61 BBCH, do: 67 BBCH	

řepka olejka ozimá	mšice zelná, pilatka řepková, dřepčik olejkový, květílka zelná, mšice	0,25 l/ha	39	1) od: 10 BBCH, do: 17 BBCH	
brambor	mandelinka bramborová (larvy a brouci)	0,1-0,15 l/ha	7	1) od: 35 BBCH, do: 65 BBCH	
pšenice ozimá	kyjatka osenní, mšice střemchová	0,2 l/ha	30	1) od: 13 BBCH, do: 21 BBCH	
pšenice ozimá	kyjatka osenní	0,2 l/ha	30	1) od: 55 BBCH, do: 77 BBCH	
pšenice ozimá	kohoutek černý	0,2 l/ha	30	1) od: 51 BBCH, do: 77 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá	200-300 l/ha	postřik	1x

Podzimní aplikace u řepky ozimé dosahuje průměrné účinnosti proti dřepčíku olejkovému, květílce zelné a pilatce řepkové.

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.
Neaplikujte přípravek do řepky olejky ozimé na zásaditých půdách.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku acetamiprid, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ, NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
řepka olejka ozimá – aplikace na podzim	25	12	6	4
řepka olejka ozimá – aplikace na jaře	30	14	6	4
brambor	12	10	4	4
pšenice ozimá	20	10	5	4

Řepka olejka ozimá – aplikace na podzim:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (svažitost $\geq 3^\circ$), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Řepka olejka ozimá – aplikace na jaře:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Brambor, pšenice ozimá:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry.

DALŠÍ OMEZENÍ:

Za účelem ochrany půdních makroorganismů neaplikujte tento přípravek včetně dalších obchodních jmen vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Kabina traktoru nebo samojízdného postřikovače musí být pro řidiče uzavřena – kabina typu 4 se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu i parám (podle ČSN EN 15695-1). NELZE použít techniku bez kabiny pro řidiče nebo kabinu s nižší ochrannou.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Zamezte styku přípravku s kůží.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných prostředků. Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se důkladně umyjte/osprchujte.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOP vyperte / očistěte.

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

OOPP při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN ISO 21420 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje	není nutná
Ochrana těla	ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – např. typu C3), (nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

OOPP při aplikaci polním postřikovačem:

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče požadovaného typu (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu, resp. i parám, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, rozšíření zorniček, slzení, křeče apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou/vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (a případné následné terapie) lze

konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 0 °C až +30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Vodu použitou k mytí postřikovače vystříkejte na plochu, na níž byl prováděn postřik za použití stejných bezpečnostních opatření. V případě použití mycích přípravků postupujte podle návodů přiložených k těmto přípravkům.

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200–1400°C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin.

Další údaje a upřesnění:

Řepka olejka ozimá

Blýskáček řepkový

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte v době náletu škůdce na plodiny, podle signalizace, od fáze přilbovitě krytých květů (v hlavním květenství jsou vidět jednotlivé, uzavřené květní pupeny) do poslední fáze květu (BBCH 55-66). Vyšší z doporučených dávek aplikujte v případě intenzivního náletu škůdce na plodiny.

Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte ve fázi kvetení, od chvíle, kdy je otevřených 40 % květů v hlavním květenství, do konce fáze kvetení (BBCH 64-69). Vyšší z doporučených dávek aplikujte v případě intenzivního náletu škůdce na plodiny.

Krytonosec čtyřzubý

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od začátku fáze kvetení, od chvíle, kdy je otevřených 10 % květů v hlavním květenství, do konce fáze kvetení (BBCH 61-67).

Mšice zelná, pilatka řepková, dřepčík olejkový, květilka zelná, mšice

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte na podzim, ošetření provádějte, když škůdce napadne plantáž nebo když se škůdce objeví podle signálů od začátku fáze vývoje listů (děložní listy plně vyvinuté) do fáze 7. listu (BBCH 10-17).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,25 l/ha + adjuvant).

Brambor

Doba pro aplikaci: ošetření proveďte v době kladení vajíček a hromadného líhnutí larev, od fáze dosažení 50 % prodlužovacího růstu do fáze plného květu (50 % květů na prvním květenství je otevřených) (BBCH 35-65). Vyšší z doporučených dávek aplikujte v případě intenzivního výskytu škůdce.

Pšenice ozimá

kyjatka osenní, mšice střemchová

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte na podzim, postřik provádějte ve chvíli náletu škůdce na pole od fáze 3 listů do počáteční fáze odnožování (BBCH 13-21).

kyjatka osenní

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte na jaře, postřik provádějte ve chvíli náletu škůdce na pole od plné fáze metání do fáze mléčné zralosti zrn (BBCH 55-77).

kohoutek černý

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte na jaře, postřik provádějte ve chvíli náletu škůdce na pole od počátku fáze metání do fáze mléčné zralosti zrn (BBCH 51-77).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,2 l/ha + adjuvant).

Poznámky:

1. Zelené části rostlin nepoužívejte jako krmivo.
2. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, užitkovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
3. Doporučuje se aplikovat přípravek při teplotě nižší než 20 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
4. V době květu plodin se doporučuje aplikovat přípravek mimo období aktivity včel.

NÁSLEDNÉ PLODINY

V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin APIS 200 SE.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Před zahájením přípravy postřikové kapaliny přesně stanovte její potřebné množství. Před použitím přípravku silně protřepejte obsah obalu. Odměřené množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače částečně naplněného vodou (se zapnutým míchadlem). Vyprázdněný obal třikrát propláchněte vodou a oplachovou kapalinu nalijte do nádrže postřikovače s postřikovou kapalinou. Poté doplňte vodu do nádrže postřikovače na potřebné množství. Pokud jste přípravek nalili do nádrže postřikovače, která není vybavena hydraulickým míchadlem, vmíchejte tekutinu mechanicky. Postřik provádějte se zapnutým míchadlem.

V případě aplikace přípravku ve směsích s jinými přípravky přesně dodržujte pokyny a kontraindikace týkající se přípravy postřikové kapaliny těchto přípravků.

V případě přestávek při postřiku před dalším pokračováním v práci důkladně zamíchejte postřikovou kapalinu v nádrži postřikovače.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka jarní	krytonosec šešulový, krytonosec čtyřzubý, bejlomorka kapustová, blýskáček řepkový, pilatka řepková, mšice	0,12-0,25 l/ha	39	1) od: 30 BBCH, do: 72 BBCH	
žito jarní	mšice, kohoutci	0,2 l/ha	30	1) od: 51 BBCH, do: 77 BBCH	
rajče, paprika, baklažán	molice skleníková, třásněnka zahradní, třásněnka západní, vrtalky, mšice, klopušky, dřepčící	0,24-0,3 l/ha nebo 0,12-0,2 l/ha dělená aplikace	3	1) od: 11 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
okrasné školky, lesní školky, lesní dřeviny	mšice, chvostokoci, pouzdrovníček modřínový	0,2 l/ha	-	1) od: 11 BBCH, do: 39 BBCH nebo od: 50 BBCH, do: 69 BBCH	
cukrovka, řepa krmná	rýhonosec řepný	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH,	

				do: 19 BBCH	
řepa salátová	dřepčík rdesnový, maločlenec čárkovitý, mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	5) pole
celer	housenky poškozující listy, vrtule celerová, pochmurnatka mrkvová, klopušky, blýskavka červivcová, blýskavka bavlníková, mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	5) pole
tuřín, vodnice	housenky poškozující listy, dřepčíci, mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	5) pole
křen selský, ředkev, pastinák, petržel kořenová, kozí brada pórolistá, černý kořen	housenky poškozující listy, dřepčíci, mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	5) pole
čekanka salátová	housenky poškozující listy, mšice	0,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	5) pole
len setý	mšice, dřepčík pryšcový, dřepčík lnový	0,12-0,25 l/ha	-	1) od: 55 BBCH, do: 69 BBCH	6) na vlákno
konopí seté	mšice	0,12-0,25 l/ha	-	1) od: 55 BBCH, do: 69 BBCH	6) na vlákno
rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta	saví a žraví škůdci	0,2 l/ha	7	1) od: 51 BBCH, do: 69 BBCH	
jahodník, brusnice brusinka, klikva	saví a žraví škůdci	0,15 l/ha	7	1) od: 51 BBCH, do: 69 BBCH	
ostružiník, maliník a mezidruhový	saví a žraví škůdci	0,2 l/ha	7	1) od: 51 BBCH, do: 65 BBCH	

kříženci					
réva	lalokonosec libečkový, klopušky, třásněnky, bejlomorky, nesytky, kříšek révový	0,2 l/ha	7	1) od: 51 BBCH, do: 65 BBCH	
jahodník velkoplodý	lalokonosci	0,15 l/ha	-	1) od: 89 BBCH, po sklizni	
maliník	nesytka maliníková	0,2 l/ha	-	1) od: 89 BBCH, po sklizni	
hrách zahradní, bob, fazol, čočka	zrnokazi, květilky, třásněnky, mšice, klopušky, listopasi	0,2 l/ha	10	1) od: 20 BBCH, do: 39 BBCH nebo od: 50 BBCH, do: 89 BBCH	5) pole
cibule, cibule šalotka, česnek, pór, pažitka	krytonosec cibulový, molík česnekový (mladé housenky), třásněnky, květilky, mšice	0,2 l/ha	14	1) od: 20 BBCH, do: 39 BBCH	5) pole
zelí hlávkové, zelí pekingské, kapusta růžičková	dřepčící, krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, pilatka řepková, třásněnky, květilka zelná, mšice	0,2 l/ha	14	1) od: 20 BBCH, do: 39 BBCH	5) pole
lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá	listopasi, mšice, třásněnky, klopuška chlupatá, zrnokazi, květilka kořenová	0,2 l/ha	39	1) od: 20 BBCH, do: 39 BBCH nebo od: 50 BBCH, do: 79 BBCH	
tabák	třásněnka zahradní, mšice	0,2 l/ha	-	1) od: 50 BBCH, do: 70 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
řepka olejka jarní, žito jarní, len setý, konopí seté, hrách, bob, čočka, fazol, cibule, cibule šalotka, česnek, pór, pažitka, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá	200-300 l/ha	postřik	1x	
rajče, paprika, baklažán	600-750 l/ha	postřik	1x nebo 2x dělená aplikace	20-30 dnů
okrasné školky, lesní školky, lesní dřeviny	250-400 l/ha	postřik	2x za rok	30 dnů
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, celer, tuřín, vodnice, čekanka salátová, křen selský, ředkev, pastinák, petržel kořenová, kozí brada pórolistá, černý kořen	300-400 l/ha	postřik	1x	
rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta, klikva, jahodník, brusnice brusinka, réva, maliník, ostružiník	200-750 l/ha	postřik	1x za rok	
jahodník velkoplodý	500-900 l/ha	postřik	1x za rok (lalokonosci)	
zelí hlávkové, zelí pekingské, kapusta růžičková	200-300 l/ha	postřik	2x	7 dnů
tabák	600-1000 l/ha	postřik	2x	20-30 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
žito jarní	18	9	5	4
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, celer, tuřín, vodnice, křen selský, ředkev, pastinák, petržel	25	12	5	4

kořenová, kozí brada pórolistá, černý kořen, čekanka salátová				
zelí hlávkové, zelí pekingské, kapusta růžičková, jahodník velkoplodý, jahodník, brusnice brusinka, klikva	18	9	4	4
réva, rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta, ostružiník, maliník a mezidruhovní kříženci	40	25	15	8
bob, čočka, fazol	16	9	4	4
hrách, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, cibule, cibule šalotka, česnek, pór, pažitka	18	8	4	4
řepka olejka jarní, len setý, konopí seté	25	12	6	4
tabák	20	9	5	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta, ostružiník, maliník a mezidruhovní kříženci	5	0	0	0

Hrách, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (svažitost $\geq 3^\circ$), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, celer, tuřín, vodnice, řepka olejka jarní, len setý, konopí seté:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (svažitost $\geq 3^\circ$), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Réva, rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta, ostružiník, maliník a mezidruhovní kříženci:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (svažitost $\geq 3^\circ$), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Zelí hlávkové, zelí pekingské, kapusta růžičková, jahodník velkoplodý, jahodník, brusnice brusinka, klikva:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Cibule, cibule šalotka, česnek, pór, pažitka:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Žito jarní, bob, čočka, fazol, křen selský, ředkev, pastinák, petržel kořenová, kozí brada pórolistá, černý kořen, čekanka salátová, tabák:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany půdních makroorganismů neaplikujte tento přípravek včetně dalších obchodních jmen vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Při použití přípravku ve sklenících nelze vyloučit riziko pro biologickou ochranu na bázi makroorganismů.

Řepka olejka jarní

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte podle signalizace, od počátku fáze prodlužovacího růstu hlavního výhonu (počátek prodlužování lodyhy) do fáze, kdy 20 % lusků dosáhlo konečné velikosti (BBCH 30-72).

Žito jarní

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte na jaře, postřik provádějte ve chvíli náletu škůdce na pole od počátku fáze metání do fáze pozdní mléčné zralosti zrn (BBCH 51-77).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,2 l/ha + adjuvant).

Rajče, paprika, baklažán

Přípravek je povoleno používat výhradně ve sklenících s trvalou konstrukcí a izolovaným podloží.

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte podle signalizace, od fáze prvního listu do plného vybarvení plodů (BBCH 11 – 89).

Okrasné školky, lesní školky, lesní dřeviny

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte podle signalizace, od fáze rozvinutí prvního pravého listu do konce fáze kvetení (BBCH 11-39, BBCH 50-69).

Cukrová řepa, krmná řepa, řepa salátová, celer, tuřín, vodnice, křen selský, ředkev, pastinák, petržel kořenová, kozí brada pórolistá, černý kořen, čekanka salátová

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od fáze 2 pravých listů do fáze 9 pravých listů (BBCH 12-19).

Len setý, konopí seté

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od fáze viditelné jednotlivé květy (ještě zavřené) do fáze konce kvetení (BBCH 55-69).

Rybíz, angrešt, temnoplodec černoplodý, růže šípková, hloh, bez černý, josta, jahodník, brusnice brusinka, klikva

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od fáze viditelných květních pupat do konce fáze kvetení (BBCH 51-69).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,15 - 0,2 l/ha + adjuvant).

Réva, ostružiník, maliník a mezidruhový kříženci

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od fáze od fáze viditelných květních pupat do fáze plného kvetení (50 % květů otevřených, BBCH 51-65).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,15 - 0,2 l/ha + adjuvant).

Jahodník velkolepý, maliník

Doba pro aplikaci: ošetření proveďte po sklizni plodů postřikem rostlin (BBCH > 89).

Hrách zahradní, bob, fazol, čočka

Doba pro aplikaci: BBCH 20-39 a 50-89

– hrách – přípravek aplikujte v době, kdy se objeví škůdce, od fáze rozvinutí všech listů do fáze plné zralosti

– bob, čočka – přípravek aplikujte v době, kdy se objeví škůdce, od počáteční fáze vývoje postranních výhonků do fáze plné zralosti

– fazole – přípravek aplikujte v době, kdy se objeví škůdce, od počáteční fáze vývoje postranních výhonků do fáze plné zralosti: zralé lusky (tvrdá semena).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,2 l/ha + adjuvant).

Cibule, cibule šalotka, česnek, pór, pažitka

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od počáteční fáze tvorby postranních výhonů do konce fáze utváření listové růžice (BBCH 20-39).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,2 l/ha + adjuvant).

Zelí hlávkové, zelí pekingské, kapusta růžičková

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte od koncové fáze vývoje listů (vývoj postranních stonků) do fáze, kdy stonek dosáhl druhově respektive odrůdově specifické velikosti (BBCH 20-39).

Pro zlepšení účinku aplikujte přípravek spolu s adjuvanty v souladu s návodem k použití (0,2 l/ha + adjuvant).

Lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá

Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte v době, kdy se objeví škůdce, od počáteční fáze vývoje postranních výhonků do fáze, kdy asi 75 % lusků dosáhne typické délky, BBCH 20-39 nebo 50-79.

Tabák

Doba pro aplikaci: postřik provádějte podle signalizace od počátku tvorby květenství do fáze vývoje tobolky semen (BBCH 50 – 70).

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.