



# Jarní ošetření obilnin a ozimé řepky

Ing. Jana Dočkalová; INNVIGO Agrar CZ s.r.o.

**Společnost INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí široké portfolio přípravků pro jarní ošetření porostů ozimé řepky i obilnin za velmi výhodných cenových podmínek.**

## Jarní ošetření obilnin

Také v letošním roce, kromě osvědčených přípravků Tristar 50 SG (tribenuron-methyl), Herbistar 200 EC (fluroxypyr) a Rassel 100 SC (florasulam), připravilo INNVIGO novinku Locus 700 WG pro jarní herbicidní ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.

Herbicid **Locus 700 WG** obsahuje 165 g/kg florasulamu, 135 g/kg metsulfuron-methylu a 400 g/kg tribenuron-methylu. Díky tomuto složení se jedná o přípravek s účinkem na široké spektrum dvouděložných plevelů, například všechny heřmánkovité, svízel, merlíky, kaštoly, mák vlčí, pcháč, brukvovité plevely včetně výdrolu řepky, violky a mnohé další.

Locus 700 WG je registrován nejen do ozimých obilnin jako je **pšenice ozimá, triticale ozimé a žito ozimé**, ale také do jarních obilnin - **ječmen jarní a pšenice jarní**, a to v jednotné dávce 30 g/ha. Účinnost přípravku není závislá na teplotě a lze ošetřovat i při nízkých jarních teplotách. Přípravek je vůči obilninám vysoce selektivní. Při aplikaci doporučujeme použít naše nové smáčedlo **Asystent** v dávce 0,1 l/ha.

## Jarní ošetření řepky ozimé

Jako první jarní fungicidní ošetření řepky ozimé, která nevyžaduje morforegulaci, anebo do polotrasličích hybridů, je vhodné aplikovat přípravek **Dafne 250 EC** (250 g/l difenoconazole) v dávce 0,4–0,6 l/ha. Při potřebě regulace řepky doporučujeme kombinaci fungicidu Dafne 250 EC (0,4–0,6 l/ha) s morforegulátorem **Regulato 300 SL** (300 g/l mepiquat-chloride, 0,5 až 0,7 l/ha). Tato společná aplikace vyniká výrazným fungicidním účinkem a morforegulačním efektem.

Další možností fungicidní ochrany a zároveň morforegulace je aplikace přípravku **Bukat 500 SC** (500 g/l tebuconazole). Jedná se o fungicid s dvojnásobnou koncentrací tebuconazolu oproti standardním produktům na našem trhu.

Pro zahuštění řídkeho porostu a podporu kořenového systému doporučujeme provést aplikaci přípravku Bukat 500 SC v dávce 0,3 až 0,5 l/ha na začátku prodlužovacího růstu (výška porostu 10–15 cm). Pro zkrácení hustých porostů je naopak nutné provést aplikaci později, kolmo 30 cm výšky porostu.

Připomínám, že přípravek Bukat 500 SC lze na jaře do řepky ozimé použít i v OP II. stupně podzemních vod.

Jarní aplikace fungicidů v řepce jsou nezbytné nejen primárně proti houbovým chorobám, ale i pro ošetření porostů poškozených z podzimu larvami dřepčíka olejkového či jarními škůdci, kdy tato poškození jsou vstupní branou pro rozvoj houbových chorob.

Postřik fungicidem je dobré doplnit kapalný listový hnojivem **Cropvit BMo**, které obsahuje 150 g/l bóru a 6 g/l molybdenu, a to za příznivou cenu.

Pro opravný zásah na jaře proti plevelům můžete využít kombinaci přípravků **Major 300 SL** (300 g/l clopyralid) v dávce 0,3 l/ha spolu s přípravkem **Zorro 300 SL** (300 g/l picloram) v dávce 0,078 l/ha. Přípravek Zorro lze použít i do OP II. stupně povrchových i podzemních vod.

Proti škůdcům ozimé řepky lze s výhodou využít **Apis 200 SE** a **Los Ovados 200 SE** (200 g/l acetamiprid, tekutá formulace) v dávce 0,18–0,2 l/ha (registrovaná 0,12 až 0,3 l/ha), které stejně jako deltamethriny **Delmetros 100 SC** a **Koron 100 SC** (0,05 l/ha) nepodléhají oznamovací povinnosti chovatelům včel.

## KOMPLEXNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ POROSTŮ

**REGULATO 300 SL**  
mepiquat-chlorid 300 g/l

**TREGUS 500 EC**  
trinexapak-ethyl 500 g/l

**KOREKT 510 SL**  
ethefon 510 g/l

- ojedinělé regulátory růstu pro český trh
- nejkoncentrovanější formulace
- excelentní výsledky kombinace **REGULATO + TREGUS**  
při brzkém jarním použití v pšenici ozimé
- pevný a silný porost ječmene jarního při použití přípravků **TREGUS a KOREKT**

| [info\\_cz@innvigo.com](mailto:info_cz@innvigo.com) | INNVIGO Agrar CZ s.r.o.  
| [www.cz.innvigo.com](http://www.cz.innvigo.com) | tel.: 226 205 420

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.