



Jak na podzimní ošetření řepky?

Ing. Roman Lesa; INNVIGO Agrar CZ s.r.o.

INNVIGO nabízí několik možností podzimní ochrany řepky, s využitím osvědčených úč. látek. Tento rok navíc rozšíření podzimních registrací o graminicid Investo 100 EC (chizalofop-P-ethyl) nebo herbicidy Zorro 300 SL (picloram) a Major 300 SL (clopyralid).

Ty lze použít v mnoha kombinacích za výhodných cenových podmínek při jejich společném nákupu nebo samostatně. Předpokladem spolehlivého účinku je dobrá příprava půdy a dostatečná půdní vlhkost. V případě déle trvajícího sucha a vysokých teplot je nutné u půdních přípravků zvýšit aplikační dávky k dávkám registrovaným.

Efactor 360 CS (clomazon 360 g/l) je nepostradatelným herbicidem hlavně pro eliminaci svízele přítuly při preemergentní aplikaci v dávce 0,15–0,25 l/ha, ať už samostatně nebo v kombinaci s přípravky Metax 500 SC a Inventor 500 SC. **Metax 500 SC (metazachlor 500 g/l)** zajišťuje spolehlivou ochranu proti širokému spektru dvouděložných

plevelů v řepce a lze ho použít po vzejití řepky (postemergentně) v dávce 1,2–1,5 l/ha. Plevelé jsou nejcitlivější ve fázi vzcházení až maximálně 4 listů. Postemergentní použití přípravku Metax 500 SC je výhodou při teplém a suchém průběhu léta a podzimu, kdy je často efektivnější aplikovat až po dešti po vzejití řepky např. s přípravkem Belkar 0,25 l/ha, popř. s graminicidem proti výdrolu obilnin nebo s insekticidem proti dřepčíkům. Metax 500 SC nelze použít v OP II. stupně podzemních vod. **Inventor 500 SC (napropamid 500 g/l)** patří mezi osvědčené přípravky s nejdelším reziduálním působením, a to i za sucha. Jeho hlavní předností je vysoká účinnost na kaskosty, merlíky, laskavce, heřmánkovité a další obtížně hubitelné dvo-

uděložné plevelé, trávovité plevelé nebo výdrol obilnin. Přípravek se používá preemergentně do 3 dnů po zasetí řepky v dávce 1,0–1,5 l/ha spolu s přípravky Efactor 360 CS a Metax 500 SC. Napropamid je jednou z nejšetnějších herbicidních účinných látek vůči řepce. Nelze ho však použít v OP II. stupně povrchových vod a jako náhradní plodinu v případě zaorávky řepky nelze na jaře použít jarní obilninu (při podzimní dávce Inventoru nad 1,5 l/ha). Graminid **Investo 100 EC** (chizalofop-P-ethyl) je vhodný zejména proti výdrolu a trávovitém plevelům v dávce 0,4 l/ha. Pro opravné zásahy lze nově využít kombinaci **Zorro 300 SL** (picloram) a **Major 300 SL** (clopyralid).

Proti dřepčíkům a květílce zelné INNVIGO nabízí na podzim do řepky olejné přípravky **Delmetros 100 SC**, resp. **Koron 100 SC (deltamethrin 100 g/l, dávka 0,05 l/ha)**. Jedná se o osvědčený pyretroidní přípravek za velmi dobrou

cenu. Další výhodou je skutečnost, že zde není ohlašovací povinnost vůči včelám a jsou účinné i proti dalším škůdcům řepky, např. proti pilatce řepkové a mšicím. Proti mšicím je však účinnější použití v kombinaci s úč. l. acetamiprid.

Řepku je na podzim nezbytné rovněž regulovat proti přerůstání a chránit proti houbovým chorobám, zvláště proti fómové hnilobě. Od loňského roku je v tomto segmentu možné použít **Bukat 500 SC (tebuconazole 500 g/l)** v dávce do 0,4 l/ha.

Pro lepší zakořenění a připravenost porostu řepky k přezimování je výhodné aplikovat suspenzní listová hnojiva s mikroprvky rozpustnými ve vodě: **Macoresco (Zn 80 g/l)** v dávce 0,5–0,8 l/ha anebo **Cropvit BMO** (B 150 g/l, Mo 5,5 g/l) v dávce 1,0 l/ha.

☞



Los Ovados 200SE

| insekticid | acetamiprid 200 g/l

✓ nepřemožitelná insekticidní ochrana v řepce olejce

✓ dlouhý reziduální a systémový účinek

✓ bez ohlašovací povinnosti

✓ výhodný společný nákup s KORON 100 SC (deltamethrin)



| INNVIGO Agrar CZ s.r.o. | info_cz@innvigo.com | www.cz.innvigo.com
| tel.: 226 205 420

innvigo
Better chemistry