



**KAPALNÉ LISTOVÉ HNOJIVO OBSAHUJÍCÍ
MIROPRVKY BÓR A MOLYBDEN**

5 L

B 11%, Mo 0,45%



NEBEZPEČÍ

H360FD – Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313 – Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 – Skládejte uzamčené.

P501 – Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy.

Obsahuje nebezpečné složky: boroholanolamin

UFI: G630-P06Q-J00K-9RJ8



Cropvit BMo

B 11%, Mo 0,45%

STOSOVÁNÍ

Plodina	Termín aplikace	Dávka (l/ha)
Oblibiny	Podzim – od fáze 3 listů do zimního klidu. Jaro – od začátku jarní vegetace do praporcového listu.	0,3–0,5
Cukrová řepa a krmná řepa	2–4 postřiky od fáze 4 listů až do pokrytí meziřádků, každých 10–14 dní	1–3
Řepka	Tvoření růžice	1–3
	Začátek vegetace	
	Prodloužovací růst	
	Fáze zelených pupenů	
Brambory	1–2 ošetření po zakrytí hrubků každých 10–14 dní, 1 ošetření po odkvětu během fáze růstu hlíz	1–2
Kukuřice	1–2 postřiky od fáze 4–6 listů každých 10–14 dní	1–3
Bobovité rostliny	Před kvetením	1–2
	Po odkvětu	
Jarní a ozimá pšenice	1 aplikace ve fázi od prvního kolénka po praporcový list	0,3–0,5
Tabák	2–3 postřiky od začátku růstu každých 10–14 dní	1–2
Jahodník	Začátek rašení	1–2
	Začátek kvetení	
Zelenina	2 postřiky během období intenzivního růstu	1–2
Ovocné stromy a keře	Růžování pupenů	1–3
	Po odkvětu	
	Začátek růstu pupenů	
	Po sklizni, před opadem listů	
Ostatní	0,2–0,5 l hnojiva na 100 l kapaliny	
Množství vody (l/ha): polní plodiny 200–300, sady 400–1000		

SOJEDNÍ	%m/m	g/l
Bor (B) ve formě boroethanolaminu, rozpustný ve vodě	11,0	150,0
Molybden (Mo) ve formě molybdenanového aniontu	0,45	6,0

Hnojivo obsahuje 4% (m/m) dusíku (N) ve formě aminu.

KFV 1(C)(II)(b): VÍCESLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI

Sojedení: boroethanolamin (CAS: 26038-87-9)¹; kde ¹KSM 1: Látky a směsi z pudivního materiálu

Cropvit BMo je tekuté listové hnojivo určené k doplnění výživy a hnojení rostlin po celou vegetační sezónu.

Aplikaci hnojiv v nouzových případech můžeme rychle a účinně odstranit nedostatek boru a molybdeny.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Bezprostředně před postřikem naplňte nádrž postřikovače do 2/3 vodou a zapněte míchadlo; přilejte doporučené množství dobře promíchaného hnojiva; přidejte přípravek na ochranu rostlin (volitelně)*; doplňte nádrž vodou na požadovaný objem; po postřiku postřikovač omyjte vodou. Tekutinu spotřebujte ihned po přípravě. Před použitím dobře promíchejte.

POZNÁMKA: Ošetření provádějte ráno nebo večer při maximální teplotě 25 °C. Teplota pracovní kapaliny by měla být alespoň 10 °C. POKUD CHCETE KOMBINOVAT HNOJIVO S JINÝMI PŘÍPRAVKY, MĚLI BYSTE PROVĚST ZKOUŠKU MÍCHÁNÍ A ZKONTROLOVAT REAKCI ROSTLIN NA SMĚS.

ZPŮSOBY APLIKACE

- Listová aplikace – všemi typy postřikovačů, doporučený objem vody 150–1000 l/ha.
- Fertigační aplikace – lze použít v závlahových systémech, včetně kapkové závlahy. Nepřekračujte koncentraci 0,3%.

Pro podrobná doporučení kontaktujte prosím společnost PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o. nebo svého distributora společnosti PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Abyste se vyhnuli rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, dodržujte pokyny pro doporučené použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálním, uzavřeném obalu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY

Skládejte v suchu, mimo dosah zdrojů tepla a slunečního záření.



TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ

Výrobce

PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
tel. 52 318 88 79
ndo@chemirol.com.pl

Výhradní distributor

INNVIKO Agrar s.r.o.
Thámová 137/16, 186 00 Praha 8
Tel. + 420 226 205 420
www.cz.innvigo.com

Doba minimální trvanlivosti: 3 roky
Č. šarže/datum výroby uvedeno na obalu

Hnojivo s obsahem mikroprvků ve formě roztoku.

5 L