



Cropvit

Premium 714

KAPALNÉ SUSPENZNÍ ANORGANICKÉ HNOJIVO, OBSAHUJÍCÍ MAKROPRVKY N,
MG, S A MIKROPRVKY CU, MN, MO, ZN



BALENÍ: **5 L**
NETTO VÁHA: 8,25 kg



CROPVIT PREMIUM je vysoko koncentrované suspenze listové hnojivo, doporučené především do obilnin. Ideální při nedostatku hořčíku, mědi, manganu a nebo zinku v obilnách. Hnojivo stimuluje metabolismus, zvyšuje odolnost rostlin, čímž se přímo podílí na vyšším výnosu.

LISTOVÁ APLIKACE
BEZPEČNÝ PRO ROSTLINY

OBSAHUJE SMÁČEČLO VYŠŠÍ ÚČINNOST
MÍCHÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

MAKROPRVKY	% m/m
Dusík celkový (N)	5,0
Nitratový dusík (NO₃)	5,0
Oxid hořečnatý (MgO)*	1,6
Oxid siřičitý (SO₂)*	9,0

MIKROPRVKY	% m/m
Měď (Cu)* ve formě síranu	4,3
Mangan (Mn)* 4% ve formě síranu, 7% jako nitrát	11,0
Molybden (Mo)* jako molybdenan sodný	0,006
Zinek (Zn)* ve formě chloridu	3,7

*kompletně rozpustné ve vodě

Hustota: 1,65 kg/l, pH 4,0-5,0

KFV 1(C)(I)(b)(f): JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROVITAMINAMI N (Mg, S) mikroživinové hnojivo 5(+1,6,+9)/5(+0,9,+6,+3,0)

SOŁZENÍ:

dusičan hořečnatý (CAS 13446-18-9), dusičnan manganatý (CAS 10377-66-9), síran manganatý (CAS 10034-96-5), kde: *KSM1: Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina	Aplikace	Termín aplikace	Dávka (l/ha)	Objem vody (l/ha)
Obilniny	1-3	Podzim – od fáze 3. listu Jaro – po zahájení vegetace	0,5 - 1,0	200 - 300
Řepka	1-3	Podzim – od fáze 4. listu Jaro – od začátku vegetace do květu	0,5 - 1,0	200 - 300
Kukuřice	1-2	Od fáze 3. – 4. listu	0,5 - 1,0	200 - 300
Cukrová řepa	1-3	Od fáze 4. listu do zakrytí mezzifadků	0,5 - 1,0	200 - 300
Brambory	1-4	Od vytvoření kolekových řádků	0,5 - 1,0	200 - 300
Luštěniny	1-2	Od viditelného vzejtí rostlin po fázi květu	0,5 - 1,0	200 - 300
Ovocné stromy a keře	1-4	Od vytvoření listů do fáze růžového poupěte nebo po zjištění deficiencie daných prvků.	0,5 - 1,0	400 - 1000
Zelena	1-4	1. aplikace při výšce rostlin 5-8 cm, následně každých 7-10 dní	0,5 - 1,0	300 - 500
Zelentinová sadba	1-4	1. aplikace po 10-14 dnech po výsadbě sazenic, následně každých 7-10 dní	0,5 - 1,0	300 - 500
Louky a pastviny	1-3	Od začátku jarní vegetace, následně vždy 7 dní po každé seči	0,5 - 1,0	200 - 300

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

1. Naplňte nádrž postřikovače do poloviny vodou
2. Zapněte míchadlo
3. Nalijte odměřené množství listového hnojiva
4. Případně přidejte přípravek na ochranu rostlin*
5. Naplňte vodou na požadovaný objem
6. Postřik by měl být použit ihned po jeho přípravě

*Doporučujeme před prvním použitím provést test místelnosti. Při přípravě postřikové kapaliny byste měli dodržet tento postup:

Po aplikaci omyjte nádrž postřikovače vodou, pokud není nutný jiný způsob čištění.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

APLIKACE POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Pro aplikaci Cropvit Premium 714 lze použít všechny typy postřikovačů, doporučené množství je 200 – 1000 l/ha. Pro zajištění účinnosti provádějte aplikaci ráno nebo večer. Cropvit Premium 714 lze aplikovat ve všech závlahových systémech, včetně kapkové závlahy.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Hnojivo by mělo být připravováno a skladováno v původním a uzavřeném obalu při teplotě v rozmezí 5 – 30 °C. Je třeba se vyhnout náhlým změnám teploty. Skladování v nevhodných podmínkách (např. při teplotách nižších než 5°C) může způsobit částečné zasažení nebo změnu barvy hnojiva. Krystaly se po zlednění vodou opět rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu produktu. Zbytky postřikové kapaliny použijte na ošetřovanou plochu.

Neskladujte ve vrstvách.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

NEBEZPEČÍ




H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 – Dráždí kůži.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P260 – Nevede dýchací prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 – Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mydla
P305 + P351 + P338 – Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332 + P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal.

Obsahuje: síran manganatý monohydrát, dusičnan manganatý. **UFI: RG4H-5EEG-RKKR-RP6T**

DODATEČNÉ INFORMACE

Pouze pro profesionální uživatele.
Před použitím dobře promíchejte

DISTRIBUTOR: PUH „Chemrol“ sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
telefonní číslo: +48 52 318 88 79, www.chemrol.com.pl

PRODUCENT: Vitafer sp. z o.o. sp. k., ul. Krakowska 19, 05-555 Tarczyn, www.vitaferpl, office@vitaferpl

VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČR: Innivigo Agrar CZ s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín