

CE

5 L

# MACORESCO

TEKUTÉ LISTOVÉ HNOJIVO OBSAHUJÍCÍ AMONIUM  
ZINEK ACETÁT K PODPĚŘE KÖRĚNĚNÍ.



## NEBEZPEČÍ



**H302** – Zdraví škodlivý při použití. **H314** – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H335** – Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H400** – Vysoce toxický pro vodní organismy. **H410** – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P264** – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. **P270** – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. **P280** – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P301 + P330 + P331** – Při POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. **P405** – Skladujte uzamčené. **P304 + P340** – Při VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. **P501** – Odstraňte obsah/obal.

Obsahuje: Chlorid zinečnatý(II).

UFI: 6710-10AK-H006-3W45

PRODUKT URČENÝ POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**MACORESCO**

Listové kapalné zinkové hnojivo, které zlepšuje prokořeňování rostlin, a tím příznivě ovlivňuje růst a výnos řepky, obilovin, kukuřice, brambor, luštěnin a nebo čerstvě zasetého travního porostu. Hnojivo obsahuje dusík ve formě amonia, který je pro rostlinu vysoce vstřebatelný. Používá se na list.

**Obsah živin:**

Zinek (Zn) ve formě chloridu, rozpustný ve vodě

8,0% m/m

**Složení**

chlorid zinečnatý (CAS: 7646-85-7); kyselina octová (CAS: 64-19-7); octan amonný (CAS: 631-61-8); oxid zinečnatý (CAS: 1314-13-2); kde: \*SM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

**Dávkování a termíny použití:**

Plodiny	Doporučené dávkování	Doporučené termíny použití
Řepka jarní a ozimá	0,8 l/ha	Použít ve fázi dvou až šesti pravých listů, v ozimé řepce od začátku jarní vegetace do fáze hybnost stříbel
Obilniny jarní a ozimé	0,8 l/ha	Aplikujte na jaře nebo na podzim, od počátku vegetace až do konce odnožování
Kukuřice	0,8-1,2 l/ha	Aplikujte ve fázi dvou až osmi pravých listů
Brambory	0,8-1,2 l/ha	Aplikujte ve fázi od dvou pravých listů až po tvorbu hlíz
Cukrová řepa	0,8 l/ha	Aplikujte od fáze 4 listů až do počátku překrývání meziřadí
Travní porosty	0,8 l/ha	Od fáze dvou listů do začátku odnožování
Luštěniny	0,8 l/ha	Aplikujte ve fázi dvou až osmi listů
Jahody	0,8-1,0 l/ha	Plantáže zakládáné z řízků (začátek podzimu): od začátku vegetace na jaře do třetího listu. Plantáže ze sazenic frigo: od začátku vegetace do druhého listu Školky: vývoj kořenů každých 7-10 dní.
Jiné měkké ovoce	0,8-1,2 l/ha	Aplikujte po zahájení jarní vegetace
Mladé sady a ovocné školky	0,8-1,0 l/ha	Aplikujte dvakrát od začátku vegetace, podruhé po 7-14 dnech
Cibulová zelenina	0,8-1,2 l/ha	Do fáze třetího listu
Kořenová zelenina	0,8-1,2 l/ha	Od začátku vegetace do fáze třetího listu
Sadba zeleniny	Rozpětí: 0,05-0,1 l v 100 l vody	Od začátku vegetace do fáze 3-7 listů, před výsadbou na trvalé stanoviště 3-5 dní

**Doporučené množství vody:** 100-200 l/ha.**Doporučený postřik:** standardní a jemný

Upozornění: Postup se provádí za klidného počasí, v oblačných dnech, brzy ráno nebo večer.

**KFV 1(C)(II)(a): JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI, MINERÁLNÍ HNOJIVO MIKRO SLOŽKA V ROZTOKU, 8% Zn****Používejte pouze při důvodné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávky.****PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:**

Nedoporučuje se:

- ▶ úlet postřikové kapaliny na sousední plodiny
- ▶ vstříven postřikové kapaliny ve spojích ošetřovaných pásů a souvratí

Hnojivo lze použít ve všech typech postřikovačů. Před přípravou postřiku pečlivě určete potřebné množství kapaliny. Balení několikrát protřepejte. Odměněné množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače částečně naplněného vodou (se zapnutým míchadlem) a doplňte vodu na požadované množství. Prázdné kanystry třikrát vypláchněte vodou a kapalinu nalijte do nádrže postřikovače s použitelnou kapalinou. Připravený roztok ihned použijte. Sříkujte se zapnutým míchadlem. Po práci zařízení důkladně vymyjte. Přípravek může během skladování procházet mírnou krystalizací, viditelnou ve formě sedimentu na dně obalu. V tomto případě sedlinu rozpusťte teplou vodou (50-60°C) a roztok nalijte do nádrže postřikovače.

**Kontaktujte INNVIGO nebo svého distributora INNVIGO pro podrobná doporučení.****Doporučené podmínky skladování:**

Skladujte v původním obalu v chladné, dobře větrané místnosti při teplotě +5°C do +30°C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů i krmiv.

**Dodatečné informace:**Hnojivo obsahuje amonný dusík (NH<sub>4</sub>) 8,0%.

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.  
Číslo šarže/datum výroby na obalu.

Mikroživinové hnojivo ve formě roztoku.

**Výrobce:**

PUH „Chemrol“ sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno  
tel. +48 52 318 88 79, e-mail: ndo@chemrol.com.pl

**Distributor:**

INNVIGO Agrar CZ s.r.o.  
Thámová 137/16, 186 00 Praha 8  
Tel. +420 226 205 420  
www.cz.innigo.com

**5 L**