



DISTRIBUTOR:
 INNVIKO Agrar CZ s.r.o.
 Thámova 137/16
 186 00 Praha 8
 Tel. +420 226 205 420
 www.cz.innvigo.com

VÝROBCE:
 PUH „Chemirol“ sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 3
 88-300 Mogilno
 Tel. +48 52 318 88 79
 e-mail: ndo@chemirol.com.pl

Hnojivo na listy s nanotechnologií pro aplikaci u všech druhů plodin

Tuhé anorganické hnojivo s makroživinami NK (Ca, Mg, S) hnojivo s obsahem stopových živin 10-13 (+20+2+12)

NANO ACTIVE FORTE je hnojivo na listy v tuhé formuli, určené k podpoře výživy a přihnojování po celé vegetační období.

OBSAH ŽIVIN [% hm.]

Celkový dusík (N)	10,0
Močovinný dusík (NH ₂)	10,0
Oxid draselný (K ₂ O) rozpustný ve vodě	13,0
Oxid vápenatý (CaO) rozpustný ve vodě	20,0
Celkový oxid hořečnatý (MgO)	2,0
Oxid sírový (SO ₃) rozpustný ve vodě	12,0
Měď (Cu) chelátovaná EDTA rozpustná ve vodě	0,15
Mangan (Mn) chelátovaný EDTA rozpustný ve vodě	0,2
Celkové železo (Fe)	0,1

Výrobek je stabilní v rozmezí pH 5,5 – 8,5. Granule – nejméně 99 % [hm.] prochází sítím s velikostí ok 0,06-1,6 mm.

KFV 1(C)(I)(a)(ii): VÍCESLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI

Složení: Uhlíčan vápenatý (CAS: 471-34-1); síran draselný (CAS: 7778-80-5); močovina (CAS: 57-13-6); kde 1 KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

NÁVOD K POUŽITÍ HNOJIVA: Hnojivo naředte s 200-400 l vody. Těsně před ošetřením naplňte nádobku postřikovače vodou do 2/3 objemu a zapněte míchadlo. Postupně přidávejte stanovenou dávku hnojiva. Po rozpuštění doplňte nádobku postřikovače vodou a začněte provádět postřik.

Pro získání podrobnějších informací k postupu kontaktujte společnost INNVIKO nebo distributora společnosti INNVIKO.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ: Hnojivo uchovávejte v původním obalu. Skladujte a přepravujte při teplotách 0°C až +25°C.

Informace o bezpečnosti a ochraně životního prostředí: Doporučuje se učinit bezpečnostní opatření, která zamezí styku s kůží a očima při práci s močovinou. Zabraňte vytváření prachu, nevdechujte prach. Chraňte před únikem do povrchových vod. Při používání nejzte, nepijte ani nekuřte. O přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce.

UPOZORNĚNÍ

- H302 Zdraví škodlivý při požití.
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 Pokyny pro bezpečné zacházení:
 P270 Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte.
 P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
 P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
 P501 Odpad / obal předejte oprávněnému příjemci odpadů.
 UFI: 8A20-M09R-G00N-PAQM




Hnojivo obsahuje močovinu, ze které se může uvolňovat čpavek a ovlivňovat kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách přijměte příslušná preventivní opatření.

DOPLNKOVÉ INFORMACE:
 NÍZKÝ OBSAH KADMIA

DATUM VÝROBY / Č. ŠARŽE

HMOTNOST NETTO
16 kg



DOBA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI:
 5 let od data výroby, datum viz obal
 Forma: granule

ROZSAH POUŽITÍ, DOBA PRO APLIKACI A DÁVKY:

Plodina	Doporučená dávka	Počet ošetření	Doporučená doba pro aplikaci
Obilniny jarní	4 kg/ha	2	• První postřik od fáze odnožování do fáze druhého kolénka • Druhý postřik od fáze praporcového listu do konce metání
Obilniny ozimé	4 kg/ha	3	• První postřik na podzim od počátku fáze odnožování • Druhý postřik na jaře po zahájení vegetace • Třetí postřik od fáze praporcového listu do konce metání
Cukrová řepa	4 kg/ha	2-3	• První postřik ve fázi 3-5 listů • Další postřiky každých 14-21 dnů
Kukuřice	4 kg/ha	1-2	• 1-2 postřiky od fáze 3-6 listů
Řepka ozimá	4 kg/ha	2-3	• První postřik na podzim ve fázi 3-5 listů • Druhý postřik na jaře po zahájení vegetace • Třetí postřik od fáze volného pupenu do začátku opadávání lístků
Řepka jarní	4 kg/ha	2	• První postřik ve fázi 3-5 listů • Druhý postřik od fáze volného pupenu do začátku opadávání lístků
Červená řepa	4 kg/ha	2-3	• První postřik ve fázi 3-5 listů • Další postřiky každých 14-21 dnů
Brambor	4 kg/ha	2-3	• První postřik po úplném vzklíčení (výška rostlin 10-15 cm) • Další postřiky každých 14-21 dnů
Cibulová zelenina	4 kg/ha	2-3	• První postřik ve fázi 3-4 listů • Další každých 14-21 dnů
Rajče	4 kg/ha	2-3	• První postřik 7 dní před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý postřik po 14 dnech od vysazení sazenic • Třetí postřik po odkvětu prvního trsu
Paprika	4 kg/ha	2-3	• První postřik 7 dní před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý postřik před kvetením • Třetí postřik na počátku tvorby plodů
Okurka	4 kg/ha	2-3	• První postřik od fáze 6 listů • Další postřiky každých 14 dnů
Brukovitá zelenina raná	4 kg/ha	2	• První postřik 3-4 dny před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý postřik po 14 dnech od vysazení sazenic
Brukovitá zelenina pozdní	4 kg/ha	3-4	• První postřik 3-4 dny před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý postřik 14 dní od vysazení sazenic • Další postřiky každých 21 dní
Salát	4 kg/ha	2	• První postřik 3-4 dny před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý postřik po 14 dnech
Fazole	4 kg/ha	3-4	• První postřik ve fázi 3-4 listů • Další každých 14 dní
Celer	4 kg/ha	3-4	• První postřik 3-4 dny před vysazením sazenic (koncentrace pro první postřik 1 %, 4 lžičky hnojiva na 1 litr vody) • Druhý po 14 dnech od vysazení sazenic • Další postřiky každých 21 dní
Ředkvička	4 kg/ha	1	• Postřik ve fázi 3 listů
Mrkev, petržel, pastinák	4 kg/ha	2	• První postřik ve fázi 4-6 listů • Druhý postřik po 14-21 dnech
Kukuřice setá	4 kg/ha	1	• První postřik ve fázi 3-6 listů
Špenát	4 kg/ha	1	• Postřik ve fázi 3-5 listů
Jahodník, maliník, rybíz, angrešt	4-5 kg/ha	2	• První postřik před kvetením • Druhý postřik 7 dní od začátku tvorby plodů
Hroznové víno	4-5 kg/ha	2-3	• První postřik poté, kdy se objeví listy • Druhý postřik před kvetením • Třetí po zformování hroznů
Jabloň	4-5 kg/ha	3-4	• První postřik ve fázi zeleného pupenu • Druhý postřik po 14 dnech od kvetení • Další postřiky mezi fází vlašského ořechu a sklizní plodů (nejpozději 14 dní před sklizní)
Hrušeň	4-5 kg/ha	3-4	• První postřik ve fázi zeleného pupenu • Druhý postřik po 14 dnech od kvetení • Další postřiky v období růstu plodů do sklizně plodů (nejpozději 14 dní před sklizní)
Víšeň, třešeň, slivoň	4-5 kg/ha	2-3	• První postřik ve fázi bílého pupenu • Další postřiky v období růstu zárodků do sklizně plodů (nejpozději 14 dní před sklizní)
Okrasné stromy	4 kg/ha	1-3	• Postřiky v době intenzivního růstu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování. VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ