

CE



SIRA
PLUS

**TEKUTÉ HNOJIVO S OBSAHEM SÍRY
A PRYSKYŘIC PŘÍRODNÍHO PŮVODU.**

- Zlepšuje zdravotní stav a odolnost rostlin vůči nepříznivým růstovým podmínkám.
- Má pozitivní vliv na vývoj rostlin. Zvyšuje výnos a kvalitu kulturních plodin.
- Použitá formulace zvyšuje ulpívání přípravku na listech.

10 L

BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMACE

SIRA Plus

Obsahuje: Síra (CAS: 7704-34-9)

POZOR

- H315** Dráždí kůži.
- H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P264** Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
- P302+P352** PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

KÓD UFI: D230-J0HS-W00M-VNN8



TABULKA APLIKACE

Plodina	Termín aplikace	Doporučené dávkování (l/ha)	Doporučené množství vody (l/ha)
Obilniny	Ozimé: na podzim od fáze 3 listů (BBCH 13), na jaře po začátku vegetace. Jarní: od fáze 3 listů	1-3	150-300
Řepka	Na podzim od fáze 4-6 listů (BBCH 14-16), na jaře po začátku vegetace	1-3	150-300
Cukrová řepa	Od začátku uzavírání řádků (BBCH 31) do konce vegetačního období	1-3	150-300
Brambory	Od začátku zakrytí řádků (BBCH 31) do začátku žloutnutí listů (BBCH 91)	1-3	100-300
Kukuřice	Od fáze 4-6 listů (BBCH 14-16)	1-3	150-300
Jabloň, hrušeň	Na začátku vegetace (BBCH 00-07)	3-5	500-750
	Nejpozději ve fázi zelených pupat (BBCH 09-55) a od opadávání pupat (BBCH 73) do 21 dnů před sklizní	1-3	
	Po sklizni (BBCH 91-97)	3-5	
Broskvoň, meruňka, švestka, višň, třešeň	Na začátku vegetace (BBCH 00-07)	3-5	500-750
	Nejpozději od začátku vývoje listů a objevení květenství (BBCH 10-57) a od druhého opadu plodů (BBCH 73) do 21 dnů před sklizní	1-3	
	Po sklizni (BBCH 91-97)	3-5	
Borůvkovník, maliník, jahodník	Před květem (BBCH 00-57) a po květu – do začátku fáze růstu plodů (BBCH 67-71)	1-3	400-600
	Po sklizni (BBCH 91-97)	3-5	
Okurka, rajče, paprika	První aplikaci lze provést ihned po výsadbě zeleniny. Termín aplikace: Aplikujte dle potřeby až tři dny před sklizní	1-3	800-1000
Brukvovitě	První ošetření lze provést po ukořenchí sazenic. Ošetření opakujte dle potřeby až tři dny před sklizní	1-3	500-700
Kořenová zelenina	První ošetření lze provést po rozvinutí třetího listu a pokračovat dle potřeby až do konce vegetačního období	1-3	500-700

KFV 1(C)(I)(b)(i): JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI (S) (+52)

Deklarovaný obsah živin % (m/m)
52 % siry (S)

Složení: Síra (CAS: 7704-34-9)¹
¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

SIRA PLUS

Hnojivo SIRA Plus se doporučuje pro použití v polních plodinách, sadech a zelenině, zejména pokud jsou vystaveny stresu způsobenému nepříznivými podmínkami růstu. Unikátní kombinace siry s přírodními pryskyřicemi (terpenoidy) zlepšuje vlastnosti pracovní kapaliny a zvyšuje tak účinnost ošetření.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte pouze v případě potřeby. Nepřekračujte dávku. Během ošetření zohledněte aktuální počasí. Pro podrobnější informace kontaktujte PUH „ChemiroI“ Sp. z o. o.

POZOR - DŮLEŽITÉ:

- ☺ vyhněte se aplikaci za intenzivního slunečního záření,
- ☺ vyhněte se postřiku za suchého, slunečného a horkého počasí a na rostliny, které vykazují známky vadnutí,
- ☺ nepoužívejte během období květu,
- ☺ produkt je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin, listových hnojiv a biostimulantů. Nekombinovat s mikrobiologickým ošetřením. V každém případě se doporučuje provést test místelnosti – nejprve rozpustíte hnojivo SIRA Plus a následně přidejte zbývající složky,
- ☺ před použitím protřepejte.

DOPORUČENÉ SKLADOVACÍ PODMÍNKY:



TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ

Zavádějící subjekt: PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 MogiIno
tel.+48 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

Výhradní distributor: INNVIKO Agrar s.r.o.
Thámova 137/16, 186 00 Praha 8
Tel. + 420 226 205 420; www.cz.innvigo.com

Datum použitelnosti: 3 roky od data výroby

Datum výroby/číslo šarže: na obalu

Forma: suspenze