

CE

CUPRUM

600 SC

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO
VE FORMĚ SUSPENZE.

Doplnňuje nedostatek mědi v rostlinách.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NEBEZPEČÍ

- H301** Toxický při použití.
- H332** Zdraví škodlivý při vdechování.
- H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P264** Po manipulaci důkladně umyjte ruce.
- P270** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
- P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- P330** Vypláchněte ústa.
- P405** Skladujte uzamčené.
- P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
- P271** Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
- P501** Odstraňte obsah/obal.

UFI: Y300-F0CE-H00S-GFJX



5L

PRODUKT URČENÝ POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

CUPRUM 600 SC je tekuté listové hnojivo určené k výživě a suplementaci během vegetačního období. Použití hnojiva urychluje růst rostlin, zvyšuje výnos a zlepšuje kvalitativní parametry. Použitím hnojiva odstraňujeme v rostlinách nedostatky mědi.

Složení	[% m/m]	[g/l]
Měď (Cu) celková ve formě oxychloridu	24,0	350,0

KFV 1(C)(II)(a): JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI, MIKRO SUSPENZNÍ HNOJIVO, 24% Cu

Složení: oxychlorid mědi (CAS: 1332-65-6)¹, kde ¹ KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu.

DÁVKOVÁNÍ A TERMÍNY APLIKACE

Plodiny	Dávkování		Termíny aplikace
	l/ha	l vody	
Jabloneš, hrušně	1-1,25	500-750	Od zahájení vegetace až do fáze zelených pupenů, 1-2 ošetření Po sklizni ovoce
	1,5	500-750	
Višně, třešně	2-2,75	500-750	Po zahájení jamí vegetace V období kvetení Po sklizni ovoce
	1,0	500-750	
	2,5	500-750	
Švestky	1,5	500-750	Ošetření provádějte v období tvorby pupenů Po sklizni ovoce a během opadu listů
	1,5-2,0	500-750	
Broskve	3,5-4,0	500-700	Velmi brzy na jaře těsně před začátkem vegetace nebo na podzim po sklizni
Jahody	0,5-1,0	400-600	Od fáze 3-4 vyvinutých listů do fáze prvního vybarvení plodů (mimo období květu)
Borůvky	0,5	400-600	Od rašení pupenů až po předkvětové fáze a posklizňové
Brambory	1,75-2,25	200-400	Od začátku vegetace do květu
Obilniny	0,5	200-300	Na začátku odnožování
Rajčata, papriky	1,5-1,75	500	2 týdny po výsadbě sazenic, poté 1-3 ošetření v intervalu 14 dnů
Okurky	1,5-2	500	Po vytvoření 6 listů, pak 1-3 ošetření v intervalu 14 dnů
Ostatní plodiny	0,5	500	V období intenzivního růstu při zvýšené potřebě
Košťálová zelenina	1,0	500-700	Maximálně 2 ošetření za období tvorby hlávky
Cukrová řepa	1,0-1,5	200-400	První ošetření po uzavření řádků, poté každých 14-21 dní

Kontaktujte INNIGO nebo svého distributora INNIGO pro podrobná doporučení.

Používejte pouze při důvodné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávky.

CUPRUM 600 SC by měl být používán v termínech a dávkách doporučených v programech hnojení pro jednotlivé druhy rostlin nebo v případě nedostatku mědi u rostlin. Kanystř před použitím protřepejte.

Aplikujte na listy ve formě vodného roztoku. Hnojivo je možné použít společně s dalšími agrochemikáliemi po zkoušce, která potvrdí možnost míchání.

Konzentraci roztoku a množství postřikové kapaliny přizpůsobte požadavkům jednotlivých druhů rostlin.

Během ošetření se vyhněte silnému slunečnímu záření, vysokým teplotám a větru. Hnojivo aplikujte rovnoměrně na celé ploše sadu nebo pole.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Před samotnou přípravou si ujasněte přesné množství postřikové kapaliny. Potřebné množství hnojiva nalijte do nádrže postřikovače částečně naplněného vodou (se zapnutým míchadlem) a dále doplňte vodou na požadované množství. Aplikujte se zapnutým míchadlem. Prázdný obal třikrát vypláchněte vodou a obsah vždy nalijte do nádrže postřikovače. Po použití zařízení důkladně umyjte.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Hnojivo skladujte v původním obalu. Skladujte a přepravujte při teplotě +5°C do +30°C.

Distributor: INNIGO Agrar CZ s.r.o.

Thámova 137/16, 186 00 Praha 8

Tel. + 420 226 205 420

www.cz.innigo.com

Výrobce: PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

tel. +48 52 318 88 79

ndo@chemirol.com.pl

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby

Datum výroby/číslo šarže:

Na obalu

5 L