

Errata - Katalog přípravků na ochranu rostlin a hnojiv 2025

V katalogu Přípravků na ochranu rostlin a hnojiv 2025 jsou uvedeny tyto chybné informace:

- **Taizza Plus 250 SC** (str. 48) - v tabulce „ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)“ ve sloupci plodina, u indikace kukuřice není uvedena informace „mimo kukuřice cukrová“.

Správně má být uvedeno:

NÁVOD K POUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
kukuřice mimo kukuřice cukrová	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	0,28 l/ha	AT	1) od: 00 BBCH, do: 09 BBCH 2) preemergentně	
kukuřice mimo kukuřice cukrová	plevele dvouděložné jednoleté	0,3 l/ha	AT	1) od: 11 BBCH, do: 13 BBCH 2) do: 13 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

- **Mollis 450 SC** (str. 78) - v tabulce „ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ (REGISTROVANÁ DÁVKA)“ u indikace pšenice ozimá ve sloupci škodlivý organismus je chybně uvedena "rez pléвовá", má být pouze „padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová“.

NÁVOD K POUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá	padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová	0,9-1 l/ha	61	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
tritikale ozimé	padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová	0,9-1 l/ha	65	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
žito ozimé	padlí travní, rez žitná	0,9-1 l/ha	67	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
ječmen jarní	padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene	0,9-1 l/ha	45	1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH	
řepka olejka	hlízenka obecná, plíseň šedá	0,9-1 l/ha	68	1) od: 55 BBCH, do: 69 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

- **Heksal 100 WG** (str. 103) - v tabulce menšinové použití ve sloupci plodina je chybně uvedeno: „Žito ozimé“, má být uvedeno "Žito jarní".

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
hrušeň, jabloň lesní, mišpule, kdouloň	regulace růstu výhonků	1,25 kg/ha	55	1) od: 31 BBCH, do: 75 BBCH	4) 0,94 kg/10 000 m ² LWA 5) venkovní prostory
žito jarní	regulace růstu a prevence poléhání	0,6 kg/ha	AT	1) ve f. 30 BBCH nebo ve f. 39 BBCH	5) pole
tabák	regulace růstu výhonků	1,25 kg/ha	AT	1) od: 20 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.