



HERBICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti plevelům

FUNGICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti houbovým chorobám



INSEKTICIDY

Přípravky na ochranu rostlin proti škůdcům

INNIVIGO Agrar CZ s.r.o.
Thámová 137/16
186 00 Praha 8
www.cz.innvigo.com
tel.: +420 226 205 420
e-mail: info_cz@innvigo.com

innigo
Better chemistry



METAX 500 SC
EFEKTOR 360 CS

VAŠE PRÉMIOVÁ ŘEPKA

**VÝHODNÉ OŠETŘENÍ ŘEPKY OLEJKY
OZIMÉ PRO PROFESIONÁLY**

www.cz.innvigo.com

METAX 500 SC

Herbicide ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k aplikaci do půdy nebo na listy, určený k likvidaci jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA

metazachlor 500 g/l (44,3% hm.)

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Přípravek je přijímán kořeny plevelů a likviduje je před vyklíčením.

Je účinný také na plevele po vyklíčení do fáze čtvrtého páru listů.

ROZSAH POUŽITÍ

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině, 2) k ŠO
Řepka olejka ozimá	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	1,2–1,5 l/ha (registrace 2,0 l/ha)	AT	1) od 11 BBCH, do 14 BBCH 2) od 10 BBCH, do 14 BBCH, svízel přitula max. BBCH 12

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
Řepka olejka	200–300 l/ha	postřik	1x

Plevele citlivé – chundelka metlice, kakost maličká, ptačinec prostřední, merlík bílý, rozrazil perský, heřmánek pravý, laskavec ohnutý

Plevele méně citlivé – svízel přitula, kokoška pastuší tobolka

EFEKTOR 360 CS

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé

ÚČINNÁ LÁTKA

clomazone 360 g/l

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Účinná látka přípravku Efektor 360 CS clomazone náleží do skupiny oxazolidonů.

Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

ROZSAH POUŽITÍ

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině, 2) k ŠO
Řepka olejka ozimá	svízel přitula, plevele dvouděložné jednoleté	0,15–0,25 l/ha (registrace 0,33 l/ha)*	AT	Přípravek aplikujte v uvedené dávce do 3 dnů po zasetí ozimé řepky olejky.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

*) nižší dávka na lehkých půdách, vyšší dávka na těžších půdách


Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
Řepka olejka	300–400 l/ha	postřik	1x

DOPORUČENÍ pro ošetření řepky olejky ozimé přípravky METAX 500 SC a EFEKTOR 360 CS

Preemergentní ošetření

(před vzejitím řepky, do 3 dnů po zasetí)


metazachlor 500 g/l*
1,2–1,4 l/ha
+ EFEKTOR 360 CS
0,2 l/ha



Postemergentní ošetření

(po vzejití řepky, nejlépe ve fázi 3–4 listy řepky olejky ozimé)

metazachlor 500 g/l (METAX 500 SC)
1,25 l/ha
+ ú.l. clopyralid, pikloram, aminopyralid
(např. GALERA PODZIM)
0,3 l/ha



*) Přípravek METAX 500 SC je aktuálně v ČR registrován vzájemným uznáním dle polské registrace pro časné postemergentní aplikace (preemergentní aplikace je v registračním řízení).