


# Xxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxx



Xxxx

inzerce

## Úspěšná strategie ochrany kukuřice

Společnost INNVIGO Agrar CZ s. r. o. nabízí zajímavá řešení v ochraně kukuřice. Úspěšné pěstování kukuřice závisí na spoustě faktorů, jedním z nich je zamezit růstu plevelů. Kvůli suchým rokům a rovněž z ekonomického hlediska se rozšiřuje postemergentní ošetření ve fázi 2–7 listů.

Naše společnost nabízí řešení jak proti dvouděložným, tak trávovitým plevelům. Cílem je poskytnout producentům kukuřice účinnou a ekonomickou ochranu proti plevelům a zajistit vysokou úroveň produktivity.

### Tudor 114 OD

Jedná se o zemědělci velmi oblíbený a vyzkoušený selektivní třísloužkový herbicid se systemickým účinkem ve formě olejové disperze za velmi příznivou cenu. Tento jedinečný přípravek je složen ze tří účinných látek: florasulam (10 g/l), nikosulfuron (80 g/l) a thifensulfuron-methyl (24 g/l). Ty jsou řazeny mezi inhibitory acetolaktát syntázy, což vede k narušení biosyntézy bílko-

vin a tím brzdí vývoj a růst plevelů. Spektrum plevelů je velmi široké, od dvouděložných až po ježatku kuří nohu. Použití je postemergentní (BBCH 12–18) v dávce 0,5 l/ha. Přípravek je přijímán především listy, ale i kořeny a rychle se v rostlině přemísťuje. První projevy jeho účinkování mohou nastat již po 4–5 dnech od ošetření. Zasažené plevely zcela odumírají 6–8 týdnů po ošetření. Aplikace by měla proběhnout při teplotě 10 až 25 °C, aby se zajistila nejlepší účinnost. Pro doplnění reziduálního účinku lze využít i jeho tank-mix s přípravkem Osorno s účinnou látkou mesotrion (100 g/l), dávkování 0,5 l/ha Tudor 114 OD a 1 l/ha Osorno.



Tudor 114 OD – jedinečný třísloužkový herbicid do kukuřice  
Foto archiv firmy

### Henik Extra 040 OD

Další možností je využití kombinací našich jednosložkových přípravků. Henik Extra 040 OD (nikosulfuron 40 g/l) je herbicid ve formě olejové disperze určený k postemergentní aplikaci proti jednoděložným plevelům a některým dvouděložným, jako jsou heřmánkovce, hluchavky či výdrol řepky. Přípravek účinkuje neefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí dvouděložné plevely ve fázi 2–4 listů nebo na jednoděložné plevely od fáze tří listů do konce odnožování. Urychlení účinku přípravku přispívá teplé a vlhké počasí. Aplikace probíhá po vzejití kukuřice od 2. do 7. listu. Jeho účinnost

(zejména proti plevelům z rodu lilkovitých – durman, lilek, blín) lze zvýšit použitím v tank-mixu opět s přípravkem Osorno s účinnou látkou mesotrion (100 g/l) v poměru Henik Extra 040 OD 1 l/ha + Osorno 1 l/ha, kde tato kombinace řeší nejširší spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici s reziduálním účinkem. Pro případný zásah proti pýru v kukuřici nabízíme Rincon 25 SG (rimsulfuron 250 g/kg) v dávce 60 g/ha + smáčedlo Asystem+ 0,1 l/ha. Rincon 25 SG je možno použít i do porostů konzumních brambor.

Ing. Jaromír Šuk  
INNVIGO Agrar CZ s. r. o.